


Protocole DDAC : Prélèvement rapide (RP)




* **Administration d'héparine** à t0 (300 IE/kg i/v). En cas de faible probabilité de mortalité et/ou en cas de risque accru d'hémorragie, le médecin de l'USI peut décider d'administrer l'héparine plus tard. La dose ne doit cependant pas être injectée après t1 (PAM < 50 mmHg).

** **PAM < 50 mmHg (selon l'âge)** : Les valeurs suivantes doivent être utilisées selon la catégorie d'âge : 0 à 1 an : < 35 mmHg ; 1 à 3 ans : < 40 mmHg ; 3 à 5 ans : < 45 mmHg ; 5 ans et plus : < 50 mmHg (pendant minimum 2 minutes).

*** **Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)**

**** Un arrêt prématuré peut se faire si après > 60 minutes à partir de t0 documenté aucun des 3 critères n'est contredit: pH < 7.2 ; BD syst < 70 mmHg ; SpO2 < 70%

Protocole DDAC : Circulation régionale normothermique (aNRP) Organes abdominaux



Zeitplan



* **Administration d'héparine** à t0 (300 IE/kg i/v). En cas de faible probabilité de mortalité et/ou en cas de risque accru d'hémorragie, le médecin de l'USI peut décider d'administrer l'héparine plus tard. La dose ne doit cependant pas être injectée après t1 (PAM < 50 mmHg).


** **PAM < 50 mmHg (selon l'âge)** : Les valeurs suivantes doivent être utilisées selon la catégorie d'âge : 0 à 1 an : < 35 mmHg ; 1 à 3 ans : < 40 mmHg ; 3 à 5 ans : < 45 mmHg ; 5 ans et plus : < 50 mmHg (pendant minimum 2 minutes).

*** **Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)**

**** Un arrêt prématuré peut se faire si après > 60 minutes à partir de t0 documenté aucun des 3 critères n'est contredit: pH<7.2; BD syst < 70mmHg; SpO2<70%

Protocole DDAC : Circulation régionale normothermique (aNRP)

Organes abdominaux et poumons



* **Administration d'héparine à t0** (300 IE/kg i/v). En cas de faible probabilité de mortalité et/ou en cas de risque accru d'hémorragie, le médecin de l'USI peut décider d'administrer l'héparine plus tard. La dose ne doit cependant pas être injectée après t1 (PAM < 50 mmHg).


** **PAM < 50 mmHg (selon l'âge)** : Les valeurs suivantes doivent être utilisées selon la catégorie d'âge : 0 à 1 an : < 35 mmHg ; 1 à 3 ans : < 40 mmHg ; 3 à 5 ans : < 45 mmHg ; 5 ans et plus : < 50 mmHg (pendant minimum 2 minutes).

*** **Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)**

**** Un arrêt prématuré peut se faire si après > 60 minutes à partir de t0 documenté aucun des 3 critères n'est contredit: pH<7.2; BD syst < 70mmHg; SpO2<70%

Protocole DDAC : Circulation régionale normothermique (aNRP)

Organes abdominaux et cœur (avec ou sans poumons)



* **Administration d'héparine** à t0 (300 IE/kg i/v). En cas de faible probabilité de mortalité et/ou en cas de risque accru d'hémorragie, le médecin de l'USI peut décider d'administrer l'héparine plus tard. La dose ne doit cependant pas être injectée après t1 (PAM < 50 mmHg).

** **PAM < 50 mmHg (selon l'âge)** : Les valeurs suivantes doivent être utilisées selon la catégorie d'âge : 0 à 1 an : < 35 mmHg ; 1 à 3 ans : < 40 mmHg ; 3 à 5 ans : < 45 mmHg ; 5 ans et plus : < 50 mmHg (pendant minimum 2 minutes).

*** **Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)**

**** Un arrêt prématuré peut se faire si après > 60 minutes à partir de t0 documenté aucun des 3 critères n'est contredit: pH<7.2; BD syst < 70mmHg; SpO2<70%